


NOWOTWORY GŁOWY I SZYI ZWIĄZANE Z WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO



MAKESENSECAMPAIGN



CZYM JEST WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?

Wirus brodawczaka ludzkiego jest bardzo rozpowszechniony; zidentyfikowano ponad 100 jego typów

Wirus brodawczaka ludzkiego atakuje skórę i błony śluzowe (wilgotne błony wyścielające takie części ciała, jak wnętrze jamy ustnej, gardła czy odbytu)



Nowotwory tego typu są określane jako „nowotwory jamy ustnej i gardła” i wchodzi w skład większej grupy, określanej jako „nowotwory głowy i szyi”


Nowotwory głowy i szyi stanowią siódmą co do częstości występowania grupę nowotworów na świecie

NOWOTWORY GŁOWY I SZYI ZWIĄZANE Z WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO

- Najnowsze badania, że ponad 5% wszystkich nowotworów związanych jest z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego
- Wykazano związek między zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, a większością nowotworów jamy ustnej i gardła
- Szacuje się, że na całym świecie około 45 000 nowych przypadków nowotworów głowy i szyi jest związanych z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego

ŚWIATOWA TENDENCJA: MROCNY OBRAZ

- W wielu międzynarodowych badaniach wykazano, że w ciągu ostatnich 20 lat nastąpił znaczny wzrost liczby przypadków nowotworów jamy ustnej i gardła powiązanych z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego
- Badania te dowodzą także, że częstość występowania nowotworów jamy ustnej i gardła związanych z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego różni się znacznie w zależności od regionu
- Uzyskane dane wskazują, że zmienność ta wynika z regionalnego i kulturowego zróżnicowania praktyk seksualnych na świecie



Szacuje się, że w takich rejonach, jak **USA** czy **Europa Północna** z wirusem brodawczaka ludzkiego związanych jest ponad 70% przypadków nowotworów jamy ustnej i gardła

Z kolei uważa się, że w takich rejonach, jak **Europa Południowa** z wirusem brodawczaka ludzkiego jest związanych tylko 17% przypadków nowotworów jamy ustnej i gardła

Niektórzy pacjenci po usłyszeniu, że chorują na nowotwór lub że są zakażeni wirusem brodawczaka ludzkiego mogą poczuć się zupełnie bezbroni i bezradni



ROZMOWA Z PACJENTAMI

Poinformuj o diagnozie

Przygotuj się do odpowiedzi na nieporadne pytania

Pomóż pacjentom uporać się z emocjami

Oceń psychospołeczne potrzeby pacjentów

ZALECENIA



Edukacja

Personel medyczny zajmujący się leczeniem nowotworów głowy i szyi powinien przekazać informacje z różnych źródeł, aby zwiększyć wiedzę na temat nowotworów głowy i szyi związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego

Edukacja powinna skupiać się na:

- chorobie
- leczeniu
- objawach
- zachowaniach seksualnych

Personel medyczny powinien mieć też świadomość, że pacjenci mogą napotykać w Internecie różne niepokojące informacje. Informacje takie rzadko opierają się na faktach, a zwykle są napisane językiem zbyt trudnym dla przeciętnego chorego



Poradnictwo

Po usłyszeniu diagnozy pacjenci mogą potrzebować porady i wsparcia emocjonalnego, w tym:

- programów rehabilitacyjnych
- ćwiczeń relaksacyjnych i nauki radzenia sobie ze stresem
- interwencji społecznych

Udzielając porad należy kłaść nacisk na psychospołeczny wpływ diagnozy i przedstawić pacjentom możliwość otrzymania skierowania do odpowiedniego specjalisty.

Personel medyczny powinien także ocenić, czy pacjent wymaga długotrwałego wsparcia zarówno medycznego jak i psychologicznego.

Kampania *Make Sense* jest prowadzona przez:



Europejskie wsparcie Kampani *Make Sense* jest dostarczane przez:

MERCK



 **Bristol-Myers Squibb**