



WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO



MAKESENSECAMPAIGN



CZYM JEST WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?

Wirus brodawczaka ludzkiego jest bardzo rozpowszechniony; zidentyfikowano ponad jego 100 typów

Wirus brodawczaka ludzkiego atakuje skórę i błony śluzowe (wilgotne błony wyścielające części ciała, takie jak wewnątrz jamy ustnej, gardła czy odbytu)

U większości osób zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego rozpoczyna się i ustępuje bez żadnych objawów. Niekiedy zanim dojdzie do zakażenia, wirus może być nieaktywny przez całe miesiące



JAKI JEST ZWIĄZEK MIĘDZY WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO A NOWOTWORAMI?

Niektóre typy wirusa brodawczaka ludzkiego, określane jako typy wysokiego ryzyka, ogólnie zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu w poniższych lokalizacjach:



Nowotwory tego typu są określane jako „nowotwory jamy ustnej i gardła” i wchodzi w skład większej grupy, określanej jako „nowotwory głowy i szyi”

Nowotwory głowy i szyi stanowią siódmą co do częstości występowania grupę nowotworów na świecie

JAK CZĘSTO WYSTĘPUJĄ NOWOTWORY GŁOWY I SZYI ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIEM WIRUSA BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?

- Ostatnio specjaliści wykryli związek między zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka a niektórymi nowotworami jamy ustnej i gardła
- Najnowsze badania wskazują, że częstość występowania nowotworów głowy i szyi związanych z wirusem brodawczaka ludzkiego zwiększa się tak szybko, że mówi się o epidemii
- Pacjenci z nowotworami głowy i szyi związanymi z wirusem brodawczaka ludzkiego są zasadniczo młodszy, w dobrym stanie zdrowia i często w wywiadzie nie stwierdza się u nich palenia tytoniu i/lub nadużywania alkoholu, tj. czynników zwiększających prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory

Szacuje się, że w około 70% przypadków przyczyną nowotworów jamy ustnej i gardła jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, jednakże konieczne są dalsze badania w tym kierunku

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI LECZENIA PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI ZWIĄZANYMI Z WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?

- Rodzaj leczenia proponowany przez lekarza zależy od lokalizacji nowotworu w głowie i szyi oraz jego ewentualnego rozprzestrzenienia się
- Dostępnych jest kilka możliwości leczenia. Lekarz wspólnie z pacjentem ustali, która metoda jest najlepsza
- Nowotwory związane z wirusem brodawczaka ludzkiego są łatwiejsze w leczeniu, gdy zostaną wcześniej rozpoznane i leczone; w związku z tym, jeżeli coś Cię niepokoi, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub dentystą

KTO MOŻE ZAKAŻIĆ SIĘ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?



Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego są bardzo częste i łatwo dochodzi do nich podczas kontaktów seksualnych (w tym w czasie stosunków pochwowych, analnych i oralnych)

Można zarazić się wirusem brodawczaka ludzkiego nawet mając tylko jednego partnera/jedną partnerkę

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego może być stwierdzone nawet u osoby niemającej żadnych objawów, która jedyny kontakt seksualny z osobą zakażoną miała wiele lat temu



Jeżeli podejrzewasz u siebie możliwość zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, porozmawiaj ze swoim lekarzem

CZY MOŻNA ZAPOBIEC ZAKAŻENIU WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?

- Aktualnie Dostępne są trzy szczepionki, których działanie polega na zapobieganiu zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego. Nie umożliwiają one wyleczenia
- Szczepionki zapewniają skuteczną ochronę przed nowymi zakażeniami wirusem brodawczaka ludzkiego niektórych typów. Nie wyleczą one już trwającego zakażenia ani choroby spowodowanej przez infekcję
- Szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego chronią również przed zakażeniem w obrębie jamy ustnej i związanych z nim nowotworami głowy i szyi



CZY MOŻNA WYKRYĆ ZAKAŻENIE WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO?

- Zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego zwykle nie towarzyszą żadne objawy, w związku z czym rozpoznawane jest ono rzadko
- Istnieją testy przesiewowe w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego, które są ważną metodą wykrywania raka szyjki macicy. Nie ma badań przesiewowych wykrywających nowotwory głowy i szyi związane z wirusem brodawczaka ludzkiego
- Możliwym sposobem wykrycia nowotworu głowy i szyi jest badanie przeprowadzone przez lekarza lub dentystę



Czy chcesz dowiedzieć się więcej o wirusie brodawczaka ludzkiego?

Najlepszym miejscem do uzyskania informacji jest gabinet Twojego lekarza lub dentysty - porozmawiaj z nimi, jeżeli coś Cię niepokoi

Dostępne są też bogate źródła informacji w Internecie:

www.makesensecampaign.eu

www.ecpc.org



Kampania *Make Sense* jest prowadzona przez:



EHNS

www.ehns.org

European Head and Neck Society

Europejskie wsparcie Kampani *Make Sense* jest dostarczane przez:

MERCK



 **Bristol-Myers Squibb**